

👉 Données globales par ruisseau acquises depuis octobre 2022

➔ Ruisseau de la Bévotte

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2022	Be1												
	Be2												
2023	Be1												
	Be2												
2024	Be1												
	Be2												
2025	Be1												
	Be2												

Débordement	
Écoulement visible	
Écoulement visible faible	
Écoulement non visible	
Assec	
Donnée non disponible	

Sur le ruisseau de la Bévotte, les écoulements diminuent généralement à partir du mois de mai et restent faibles jusqu'à septembre, voire octobre selon les années. Depuis le début du suivi, un seul mois d'assec a été observé, en juillet. La présence de plusieurs stations d'épuration rejetant de l'eau dans le ruisseau durant l'été peut en partie expliquer ce nombre limité d'assecs.

➔ Ruisseau de Malroy

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2022	Mal1												
	Mal2												
2023	Mal1												
	Mal2												
2024	Mal1												
	Mal2												
2025	Mal1												
	Mal2												

Débordement	
Écoulement visible	
Écoulement visible faible	
Écoulement non visible	
Assec	
Donnée non disponible	

Pour le ruisseau de Malroy, les écoulements diminuent généralement à partir du mois de mai et restent faibles jusqu'en septembre. En 2025, cette baisse a débuté plus précocement, dès avril, et un assec a été observé en août. Il s'agit du premier épisode d'assec relevé sur ce ruisseau depuis le début du suivi.

Par ailleurs, le ruisseau de Malroy est, à ce jour, le seul du territoire à avoir connu une situation de débordement au niveau de la station de suivi.

➔ Ruisseau d'Argancy

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2022												
2023												
2024												
2025												

Débordement	
Ecoulement visible	
Ecoulement visible faible	
Ecoulement non visible	
Assec	
Donnée non disponible	

Pour le ruisseau d'Argancy, les écoulements diminuent habituellement à partir du mois de mai et restent faibles jusqu'en août. Toutefois, en 2024 et en 2025, cette baisse s'est prolongée à l'automne, avec des niveaux également réduits en octobre et en novembre.

Depuis le début du suivi, deux épisodes d'assec d'une durée d'un mois ont été observés : le premier en juin 2023 et le second en août 2025.

➔ Ruisseau de la Ravèrte

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2022												
2023												
2024												
2025												

Débordement	
Ecoulement visible	
Ecoulement visible faible	
Ecoulement non visible	
Assec	
Donnée non disponible	

Pour le ruisseau de la Ravèrte, les écoulements sont généralement faibles d'avril à octobre. Il s'agit du ruisseau du territoire qui présente la période de basses eaux la plus longue. Comme pour le ruisseau d'Argancy, deux épisodes d'assec d'une durée d'un mois ont été observés : le premier en juin 2023 et le second en août 2025.